

【胃がん】SP療法 (short hydration)

点滴	Day8	
	① 維持輸液500mL パロセトロン点滴静注0.75mg	(60分)
	② ホスナビタントン注235mg デキサメタゾン注3.3mg デキサメタゾン注6.6mg	(30分)
	③ 維持輸液500mL 硫酸マグネシウム水和物20mEq	(60分)
	④ D-ソルビトール、D-マンニトール注300mL	(60分)
	⑤ シスプラチン注(60mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液500mL (400mL)	(120分)
⑥ 生理食塩液500mL 塩化カリウム注10mEq	(60分)	
処方	Day1-21	
	○テガフル・キメラシ・オテラシカルウム配合OD錠(100mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×	
	Day9-11	
	○デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	35日サイクル	

【胃がん】Ramucirumab+PTX療法

	Day1,15	Day8
点滴	① グラネトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミンレイン酸塩注10mg (30分)	① 生理食塩液50mL デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミンレイン酸塩注10mg (15分)
	② 生理食塩液50mL (15分)	② グラネトロン注3mg (30分)
	③ ラムシルマブ注(8mg/kg) 生理食塩液250mL (60分)	③ ハクリタキセル注(80mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液250mL (60分)
	④ 生理食塩液100mL (60分⇒15分)	④ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
	⑤ ハクリタキセル注(80mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液250mL (60分)	
	⑥ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)	
内服		
サイクル	28日サイクル	

【胃がん】Ramucirumab療法

Day1	
点滴	生理食塩液 50mL ① d-ケルフェニミンマレイン酸塩注10mg (15分) デキサメタゾン注6.6mg
	② 生理食塩液 50mL (15分)
	③ ラムシルマブ注(8mg/kg) (60分) 生理食塩液 250mL
	④ 生理食塩液100mL (60分⇒15分)
内服	
サイクル	14日サイクル

## 【胃がん】SOX療法

点滴	Day1	
	① ハロセトン点滴静注0.75mg ホスナツピタト注235mg テキサマゾン注1.65mg テキサマゾン注3.3mg (30分)	
	② オキサリプラチン注(100mg/m <sup>2</sup> ) テキサマゾン注1.65mg 精製ブドウ糖5%250mL (120分)	
	③ 生理食塩液 50mL (15分)	
内服	Day1-14	
	○テガフル・キマシル・チラルカルウム配合OD錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
	○テキサマゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胃癌】トラスツスマブデルクステカン療法

Day1	
点滴	① ハ°ロ/セトロン注0.75mg ホスネツヒ°タント注235mg デ°キサメタゾ°ン注1.65mg デ°キサメタゾ°ン注3.3mg (30分)
	② トラスツスマブデルクステカン注(6.4mg/kg) 5%精製ブ°ト°ウ糖100mL (90⇒30分)
	④ 生理食塩液 50mL (最終フラッシュ用)
Day2-4	
	デ°キサメタゾ°ン錠4mg 1錠 1× 朝食後
サイクル	21日サイクル

【胃がん】SOX+Nivolumab療法

Day1	
点滴	① ハロセトロン注0.75mg ホスナツビタクト注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	② 生理食塩液100mL ニボルマブ注(360mg/body) (30分)
	③ 精製ブドウ液5%250mL デキサメタゾン注1.65mg オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> ) (120分)
	④ 生理食塩液 50mL (15分)
Day1-14	
内服	○テカフル・キメラシル・オキサリプラチン配合OD錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×
	Day2-4
サイクル	○デキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後
	21日サイクル

## 【胃がん】HER+SOX療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液 50mL (ルート確保用)
	② 生理食塩液 250mL トラスツズ マブ注 (初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) (90分⇒30分)
	③ ハロプロトン注0.75mg ホスニツビ タト注235mg デキサマゾン注1.65mg デキサマゾン注3.3mg (30分)
	④ オキサリプラチン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 精製ブドウ液5%250mL (120分)
	⑤ 生理食塩液 50mL (15分)
Day1-14	
内服	○テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(100mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×
	Day2-4
	○デキサマゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後
サイクル	21日サイクル

【胃がん】XP+HER療法 (short hydration)

点滴	Day1	
	①	維持輸液500mL (60分)
	②	生理食塩液 50mL (15分) デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg
	③	トラスツマブ 注射用 (8mg/kg⇒6mg/kg) (90分⇒30分) 生理食塩液 250mL
	④	ホスアプレピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分) 生理食塩液 250mL
	⑤	パロセトン点滴静注0.75mg (15分)
	⑥	維持輸液500mL (60分) 硫酸Mg補正液20mEq
	⑥	20%マンニトール注射液300mL (60分)
	⑦	シプラーン点滴静注 (80mg/m <sup>2</sup> ) (120分) 生理食塩液500mL (400mL)
⑧	生理食塩液500mL (60分) KCL注10mEq	
内服	Day1-14	
	○カシタヒン錠(2000mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後	
	Day2-4	
	○デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	



【胃がん】SP療法 (short hydration)

点滴	Day8	
	① 維持輸液500mL	(60分)
	② ホスアプレピタントゲルミン点滴静注用150mg 生理食塩液250mL	(60分)
	③ ハロセトロン点滴静注0.15mg デキサメタゾン注3.3mg デキサメタゾン注6.6mg	(15分)
	④ 維持輸液500mL 硫酸Mg補正液20mEq	(60分)
	④ 20%マンニトール注射液300mL	(60分)
	⑤ シスプラチン注(60mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液500mL (400mL)	(120分)
⑥ 生理食塩液500mL KCL注10mEq	(60分)	
処方	Day1-21	
	○テカフル・キメシル・オテラシルカリウム配合錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2×朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×	
	Day9-11	
	○デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	35日サイクル	

【胃がん】SP+HER療法 (short hydration)

点滴	Day1	
	①	維持輸液500mL (60分)
	②	生理食塩液 50mL デキサメタゾン注6.6mg (15分) デキサメタゾン注3.3mg
	③	トラスツス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> 注 (8mg/kg⇒6mg/kg) (90分⇒30分) 生理食塩液 250mL
	④	ホスア <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> タントメルミン点滴静注用150mg (60分) 生理食塩液250mL
	⑤	パ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン点滴静注0.75mg (15分)
	⑥	維持輸液500mL (60分) 硫酸mg補正液20mEq
	⑦	20%マンニトール注射液300mL (60分)
内服	⑦	シス <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン点滴静注 (60mg/m <sup>2</sup> ) (120分) 生理食塩液500mL (400mL)
	⑧	生理食塩液500mL (60分) KCL注10mEq
内服	Day1-14	
	テ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ・ キ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ・ オ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ウ <sup>®</sup> ム配合OD錠 (80mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積 < 1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤ 体表面積 < 1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤ 体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
サイクル	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
	21日サイクル	

## 【胃がん】SOX療法

点滴	Day1	
	①	生理食塩液250mL ホスアピピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分)
	②	パロセトン点滴静注0.75mg デキサメタゾン注1.65mg (15分) デキサメタゾン注3.3mg
	③	オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> ) デキサメタゾン注1.65mg (120分) ブドウ糖注射液5%250mL
④	生理食塩液 50mL (15分)	
内服	Day1-14	
	○テカフル・キメシル・オキサリプラチン配合OD錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2×朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
	○デキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

## 【胃がん】RAM療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液 50mL d-ケルフェニラミン酸塩注10mg (15分)
	② 生理食塩液 50mL (15分)
	③ ラムシルマブ <sup>®</sup> 注(8mg/kg) 生理食塩液 250mL (60分)
	④ 生理食塩液100mL (60分⇒15分)
内服	
サイクル	14日サイクル

## 【胃がん】Nivolumab 療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液 50mL (15分)
	② ニボルマブ注 (240mg/body) (30分) 生理食塩液100mL
	③ 生理食塩液 50mL (15分)
内服	
サイクル	14日サイクル

## 【胃がん】DTX+S-1療法

Day1							
点滴	① グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)						
	② トセタキセル注(40mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 250mL (60分)						
	③ 生理食塩液 50mL (15分)						
Day1-14							
内服	○テカフル・ギメシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 <table border="0"> <tr> <td>体表面積 &lt; 1.25m<sup>2</sup></td> <td>80mg 2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m<sup>2</sup> ≤ 体表面積 &lt; 1.50m<sup>2</sup></td> <td>100mg 2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m<sup>2</sup> ≤ 体表面積</td> <td>120mg 2×</td> </tr> </table>	体表面積 < 1.25m <sup>2</sup>	80mg 2×	1.25m <sup>2</sup> ≤ 体表面積 < 1.50m <sup>2</sup>	100mg 2×	1.50m <sup>2</sup> ≤ 体表面積	120mg 2×
体表面積 < 1.25m <sup>2</sup>	80mg 2×						
1.25m <sup>2</sup> ≤ 体表面積 < 1.50m <sup>2</sup>	100mg 2×						
1.50m <sup>2</sup> ≤ 体表面積	120mg 2×						
サイクル	21日サイクル						

【胃がん】DTX+CDDP+S-1(short hydration)療法

点滴	Day1	
	①	維持輸液500mL (60分)
	②	ホスフ°レピ°タントメ°ルミン点滴静注150mg 生理食塩液 250mL (60分)
	③	ハ°ロ/セトロン点滴静注0.75mg デ°キサメゾン注6.6mg (15分) デ°キサメゾン注3.3mg
	④	ト°セタキセル注(40mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 250mL (60分)
	⑤	維持輸液500mL 硫酸mg補正液 (60分)
	⑤	20%マンニトール注射液300mL (60分)
	⑥	シスフ°ラチン点滴静注(60mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液500mL (120分)
⑦	生理食塩液500mL KCL注10mEq (60分)	
内服	Day1-14	
	○テカ°フル°キ°メラシル°オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m <sup>2</sup> /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m <sup>2</sup> 80mg2× 1.25m <sup>2</sup> ≤体表面積<1.50m <sup>2</sup> 100mg2× 1.50m <sup>2</sup> ≤体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
	○デ°キサメゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	28日サイクル	

## 【胃がん】RAM+PTX療法

	Day1,15	Day8
点滴	① グラセトン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)	① 生理食塩液50mL デキサメタゾン注6.6mg (15分)
	② 生理食塩液50mL (15分)	② グラセトン注3mg (30分)
	③ ラムシルマ <sup>®</sup> 注(8mg/kg) 生理食塩液250mL (60分)	③ パクリタセル注(80mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液250mL (60分)
	④ 生理食塩液100mL (60分⇒15分)	④ 生理食塩液50mL (15分)
	⑤ パクリタセル注(80mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液250mL (60分)	
	⑥ 生理食塩液50mL (15分)	
内服		
サイクル	28日サイクル	



## 【胃がん】CPT-11

Day1,15	
点滴	① 生理食塩液250mL ホスアプレピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分) パロセトン点滴静注0.75mg
	② テキサメゾン注1.65mg (15分) テキサメゾン注3.3mg
	③ <b>イリテカン注(150mg/m<sup>2</sup>)</b> (90分) 生理食塩液500mL
	④ 生理食塩液 50mL (15分)
Day2-4,16-18	
内服	○テキサメゾン錠4mg 1錠1×朝食後
サイクル	28-35日サイクル