

【胃がん】CPT-11

	Day1,15	
点滴	①	ハロペトロン点滴静注0.75mg ホスナビト注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	イリテカン注(150mg/m ²) 生理食塩液500ml (90分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
	Day2-4,16-18	
内服	デキサメタゾン錠4mg 1錠1×朝食後	
サイクル	28-35日サイクル	

【胃がん】DTX+CDDP+S-1(short hydration)療法

点滴	Day1							
	①	維持輸液500ml (60分)						
	②	ハ°ロ/セトロン点注0.75mg ホスネツヒ°タト注235mg デ°キサタリ°ン注6.6mg デ°キサタリ°ン注3.3mg (30分)						
	③	ト°セタキセル注(40mg/m ²) 生理食塩液250ml (60分)						
	④	維持輸液500ml 硫酸mg補正液 (60分)						
	④	20%マンニトール注射液300ml (60分)						
	⑤	シフ°ラチン点滴静注(60mg/m ²) 生理食塩液500ml (120分)						
⑥	生理食塩液500ml KCL注10mEq (60分)							
内服	Day1-14							
	○デカ°フル°キ°メラシル°オララルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>体表面積 < 1.25m²</td> <td>80mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m² ≤ 体表面積 < 1.50m²</td> <td>100mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m² ≤ 体表面積</td> <td>120mg2×</td> </tr> </table>		体表面積 < 1.25m ²	80mg2×	1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×	1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×
	体表面積 < 1.25m ²	80mg2×						
1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×							
1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×							
Day2-4								
	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後							
サイクル	28日サイクル							

【胃がん】DTX+S-1療法

点滴	Day1	
	①	ケラセトロン注3mg テキサメタゾン注6.6mg (30分)
	②	トセタキセル注(40mg/m ²) 生理食塩液250ml (60分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-14	
	○テカフル・キメシル・オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg2×	
サイクル	21日サイクル	

【胃がん】Nivolumab 療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml (ルート確保用)
	② ニボルマブ [®] 注 (240mg/body・480mg/body) (30分) 生理食塩液100ml
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	14日サイクル・28日サイクル

【胃がん】SP+HER療法 (short hydration)

点滴	Day1							
	①	維持輸液500ml (60分)						
	②	生理食塩液50ml デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg (15分)						
	③	トラスツブマブ注(8mg/kg⇒6mg/kg) 生理食塩液250ml (90分⇒30分)						
	④	ハロ/セトロン注0.75mg ホスネツピタント注235mg (30分)						
	⑤	維持輸液500ml 硫酸mg補正液20mEq (60分)						
	⑥	20%マンニトール注射液300ml (60分)						
点滴	⑥	シフトラチン点滴静注(60mg/m ²) 生理食塩液500ml(400ml) (120分)						
	⑦	生理食塩液500ml KCL注10mEq (60分)						
内服	Day1-14							
	○デガフル・ギメラシル・オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2×朝夕食後 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>体表面積 < 1.25m²</td> <td>80mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m² ≤ 体表面積 < 1.50m²</td> <td>100mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m² ≤ 体表面積</td> <td>120mg2×</td> </tr> </table>		体表面積 < 1.25m ²	80mg2×	1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×	1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×
	体表面積 < 1.25m ²	80mg2×						
1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×							
1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×							
Day2-4								
内服	デキサメタゾン錠4mg2錠 1×朝食後							
	サイクル	21日サイクル						

【胃がん】XP+HER療法 (short hydration)

点滴	Day1	
	①	維持輸液500ml (60分)
	②	生理食塩液50ml (15分) デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg
	③	トラスツスマブ注(8mg/kg⇒6mg/kg) (90分⇒30分) 生理食塩液250ml
	④	パロセトロン注0.750mg (30分) ホスネピタント注235mg
	⑤	維持輸液500ml (60分) 硫酸Mg補正液20mEq
	⑤	20%マンニトール注射液300ml (60分)
	⑥	シフトラチン点滴静注(80mg/m ²) (120分) 生理食塩液500ml (400ml)
⑦	生理食塩液500ml (60分) KCL注10mEq	
内服	Day1-14	
	○カベシタピン錠(2000mg/m ² /日)	2× 朝夕食後
	Day2-4	
	デキサメタゾン錠4mg2錠 1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胃がん】HER+SOX療法

点滴	Day1							
	①	生理食塩液50ml (ルート確保用)						
	②	生理食塩液250ml トラスツブマブ注(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) (90分⇒30分)						
	③	ハロネトロン注0.75mg ホスネビタント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)						
	④	オキサリプラチン注(100mg/m ²) 精製ブドウ液5%250ml (120分)						
⑤	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)							
内服	Day1-14							
	○デガフル・ギメシル・チラルカルウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 <table border="0"> <tr> <td>体表面積<1.25m²</td> <td>80mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m²≤体表面積<1.50m²</td> <td>100mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m²≤体表面積</td> <td>120mg2×</td> </tr> </table>		体表面積<1.25m ²	80mg2×	1.25m ² ≤体表面積<1.50m ²	100mg2×	1.50m ² ≤体表面積	120mg2×
	体表面積<1.25m ²	80mg2×						
1.25m ² ≤体表面積<1.50m ²	100mg2×							
1.50m ² ≤体表面積	120mg2×							
Day2-4								
	デキサメタゾン錠4mg1錠 1×朝食後							
サイクル	21日サイクル							

【胃がん】SOX+Nivolumab療法

点滴	Day1							
	①	ハ°ロ/セトロン注0.75mg ホスニツビ°タト注235mg テ°キサメタゾン注1.65mg テ°キサメタゾン注3.3mg (30分)						
	②	生理食塩液100ml ニホ°ルマフ°注(360mg/body) (30分)						
	③	精製フト°ウ液5%250ml テ°キサメタゾン注1.65mg オキサリフ°ラチン注(130mg/m ²) (120分)						
④	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)							
内服	Day1-14							
	○テカ°フル°ギ°メラシル°オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 <table border="0"> <tr> <td>体表面積<1.25m²</td> <td>80mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m²≤体表面積<1.50m²</td> <td>100mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m²≤体表面積</td> <td>120mg2×</td> </tr> </table>		体表面積<1.25m ²	80mg2×	1.25m ² ≤体表面積<1.50m ²	100mg2×	1.50m ² ≤体表面積	120mg2×
	体表面積<1.25m ²	80mg2×						
1.25m ² ≤体表面積<1.50m ²	100mg2×							
1.50m ² ≤体表面積	120mg2×							
Day2-4								
	テ°キサメタゾン錠4mg1錠 1×朝食後							
サイクル	21日サイクル							

【胃がん】トラスツスマブテルクステカン療法

Day1	
点滴	① ハロプロトン注0.75mg ホスネツビタト注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	② トラスツスマブテルクステカン注(6.4mg/kg) 5%精製ブドウ糖100ml (90⇒30分)
	④ 精製ブドウ糖5%100ml (最終フラッシュ用)
Day2-4	
内服	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後
サイクル	21日サイクル

【胃がん】SOX療法

点滴	Day1	
	①	ハロヘトロン点滴静注0.75mg ホスニビタト注235mg デキメタゾン注1.65mg デキメタゾン注3.3mg (30分)
	②	オキサリプラチン注(100mg/m ²) デキメタゾン注1.65mg 精製ブドウ糖5%250ml (120分)
③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服	Day1-14	
	○デガフル・ギメシル・オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
	デキメタゾン錠4mg1錠1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胃がん】Ramucirumab療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml d-クルルフェニラミン酸塩注10mg デキサメタゾン注6.6mg (15分)
	② 生理食塩液50ml (15分)
	③ ラムシルマブ注(8mg/kg) 生理食塩液250ml (60分)
	④ 生理食塩液100ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	14日サイクル

【胃がん】Ramucirumab+PTX療法

	Day1,15	Day8
点滴	① グラネトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-ケルフェニラミンレイン酸塩注10mg (30分)	① 生理食塩液50ml デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-ケルフェニラミンレイン酸塩注10mg (15分)
	② 生理食塩液50ml (15分)	② グラネトロン注3mg (30分)
	③ ラムシルマブ注(8mg/kg) 生理食塩液250ml (60分)	③ ハクシタキセル注(80mg/m ²) 生理食塩液250ml (60分)
	④ 生理食塩液100ml (60分⇒15分)	④ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
	⑤ ハクシタキセル注(80mg/m ²) 生理食塩液250ml (60分)	
	⑥ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服		
サイクル	28日サイクル	

【胃がん】SP療法 (short hydration)

	Day8						
点滴	① 維持輸液500ml 硫酸マグネシウム水和物20mEq (60分)						
	② ハロノセトロン点滴静注0.75mg ホスネツピタント注235mg テキサメタゾン注3.3mg テキサメタゾン注6.6mg (30分)						
	③ 維持輸液500ml 硫酸マグネシウム水和物20mEq (60分)						
	④ D-ソルビトール、D-マンニトール注300ml (60分)						
	⑤ シスプラチン注 (60mg/m ²) 生理食塩液500ml (400ml) (120分)						
	⑥ 生理食塩液500ml 塩化カリウム注10mEq (60分)						
	Day1-21						
内服	○テガフル・ギメラシル・オラシルカリウム配合OD錠 (80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">体表面積 < 1.25m²</td> <td>80mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m² ≤ 体表面積 < 1.50m²</td> <td>100mg2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m² ≤ 体表面積</td> <td>120mg2×</td> </tr> </table>	体表面積 < 1.25m ²	80mg2×	1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×	1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×
	体表面積 < 1.25m ²	80mg2×					
1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg2×						
1.50m ² ≤ 体表面積	120mg2×						
	Day9-11						
	テキサメタゾン錠4mg2錠 1× 朝食後						
サイクル	35日サイクル						

【胃がん】RAM+nab-PTX療法

	Day1.15	Day8
点滴	① ゲラネトロン注3mg d-ケロルフェニラミン塩酸注10mg デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg (30分)	① ゲラネトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)
	② 生理食塩液50ml (RAM投与前フラッシュ用)	② ハクリタキセルアルブミン懸濁型(100mg/ml) 生理食塩液100ml (30分)
	③ ラムシルマフ注(8mg/kg) 生理食塩液250ml (60分⇒30分)	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
	④ 生理食塩液50ml (RAM投与後フラッシュ用)	
	⑤ 生理食塩液50ml (側管ルート確保用)	
	⑥ ハクリタキセルアルブミン懸濁型(100mg/ml) 生理食塩液100ml (30分)	
	⑦ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服		
サイクル	28日サイクル	

【胃がん】SOX+HER+Pembrolizumab療法

Day1	
点滴	① ハロヘトロン注0.75mg ホスナビタクト注235mg テキサメタゾン注4.95mg (30分)
	② ヘムフロリスマフ注(200mg/body) 生理食塩液100ml (30分)
	③ トラスツスマフ注(8mg/kg⇒6mg/kg) 生理食塩液250ml (90⇒60分)
	④ 生理食塩液50ml (15分)
	⑤ オキサリプラチン注(130mg/m²) テキサメタゾン注1.65mg (120分) 5%精製ブドウ糖250ml
	⑥ 生理食塩液50ml (15分)
Day1-14	
内服	○テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg 2×
	Day 2-4
	テキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後
サイクル	21日サイクル

【胃がん】RAM+CPT-11療法

点滴	Day1	
	①	生理食塩液50ml d-ケルフェニラミン酸塩注10mg デキサメタゾン注4.95mg (15分)
	②	ハロプロトン点注0.75mg ホスナビタント注235mg (30分)
	③	ラムシルマフ注(8mg/kg) 生理食塩液250ml (60分⇒30分)
	④	生理食塩液50ml (5分)
	⑤	イリリテカン注(150mg/m ²) 生理食塩液250ml (90分)
⑥	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
	Day 2-4	
デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後		
サイクル	14日サイクル	