

【胆管がん】GEM療法

Day1.8.15	
点滴	① グラネセロン注3mg テキサメタゾン注6.6mg (30分)
	② ゲムシタビン注(1000mg/m ²) 5%精製ブドウ糖100ml (30分)
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	28日サイクル

【胆道がん】GS療法

点滴	Day1-8	
	①	ゲラセトロン注3mg テキサメタゾン注6.6mg (30分)
	②	ゲムシタビン注(1000mg/m ²) 5%精製ブドウ糖100ml (30分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-14	
	○テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg 2×	
サイクル	21日サイクル	

【胆道がん】GC+イミフィンジ療法

	Day1	Day8
点滴	① 維持輸液500ml (60分)	① 維持輸液500ml (60分)
	② ハロプロトン注0.75mg ホスネツピタト注235mg テキサメタゾン注9.9mg (30分)	② ハロプロトン注0.75mg ホスネツピタト注235mg テキサメタゾン注9.9mg (30分)
	③ テュルハルマフ注(1500mg/body) 生理食塩液100ml (60分)	③ 維持輸液500ml 硫酸Mg補正液20mEq (60分)
	④ 維持輸液500ml 硫酸Mg補正液20mEq (60分)	④ D-ソルビトール、D-マンニトール注300ml (60分)
	④ D-ソルビトール、D-マンニトール注300ml (60分)	④ シスプラチン注(25mg/m ²) 生理食塩液500ml (90分)
	⑤ シスプラチン注(25mg/m ²) 生理食塩液500ml (90分)	⑤ 生理食塩液500ml KCL注10mEq (60分)
	⑥ 生理食塩液500ml KCL注10mEq (60分)	⑥ ゲムシタビン注(1000mg/m ²) 5%精製ブドウ糖100ml (30分)
	⑦ ゲムシタビン注(1000mg/m ²) 5%精製ブドウ糖100ml (30分)	⑦ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
⑧ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)		
内服	Day2-4 Day9-11	
	テキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胆道がん】GCS療法

点滴	Day1	
	①	維持輸液500ml (60分)
	②	ハ`ロ/セトロン注0.75mg ホスネツビ`カント注235mg テ`キサメタゾン注9.9mg (30分)
	③	維持輸液500ml 硫酸Mg補正液20mEq (60分)
	④	D-ソルビ`トル、D-マンニ`トル注300ml (60分)
	⑤	シスプ`ラチン注(25mg/m ²) 生理食塩液500ml (90分)
	⑥	維持輸液500ml KCL注10mEq (60分)
	⑦	ゲ`ムシタピン注(1000mg/m ²) 5%精製ブ`ドウ糖100ml (30分)
	⑦	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-7	
	○テガ`フル・キ`メラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg 2×	
	Day2-4	
	テ`キサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	14日サイクル	